

$3\frac{1}{3}$ — $1\frac{3}{4}$ poll. longa, $1\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lata. *Singuli ramuli* (breves et paucifolii) media altitudine vel apice unum vulgo *pedunculum* compressum uncinato-recurvum $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ poll. longum proferunt. *Flores* omnes ceciderunt; unum tantum exiguum alabastrum partim destructum vidi. — *Madagascar*, regio borealis occidentalis: PERVILLE n. 396.

ARTABOTRYS ODORATISSIMUS R. BR. — Specimina *sumatrana* foliis duplo maioribus a iavanicis, quae BL. descriptis, differunt, conspecifica tamen habeo. *Folia* e basi acuta elliptico-oblonga abrupte obtuse acuminata, 6—7 poll. longa. *Petala* utrinque pubera, basi densius, exteriora fere pollicaria latiuscule lanceolata acutiuscula, interiora breviora et angustiora; *calyx* intus glaber, extus puberulus. *Stamina* numerosa, connectivi processu haud valde dilatato, sed convexiusculo subrotundo pulverulento. *Carpella* in *tori* vertice pilosulo 8—12, glabriuscula ovoidea, *stigmate* ovato acutiusculo deflexo. — Numero carpellorum parumper maiore a vulgari forma etiam recedere videtur. — E pedunculi communis basi passim folium normale efformatum vidi. — *Sumatra*: KORTHALS. — *Timor?*: SPANOGHE (sed flores desunt, unde haud omnino certum).

ARTABOTRYS BLUMEI HOOK. fil. et THOMS. *Pedunculus fructifer* valde incrassatus lignosus; *tori* basis nunc in longitudinem aucta, unde apex convexus in altum elevatus.

ARTABOTRYS INTERMEDIUS HASSK. — Specimina authentica ex *Hort. bog.* examinavi: *innovationes* rufule strigosae, cito glabratae, ita ut ramuli cum *foliis* adultis glaberrimi. Haec *petiolis* haud crassis antice canaliculatis 2— $1\frac{1}{2}$ lin. longis suffulta, e basi attenuata acuta obverse elliptico-oblonga usque sublanceolata, in acumen longiusculum obtusiusculum desinentia, alia minora elliptica oblique acuminata, 7— $2\frac{1}{2}$, vulgo circiter 5 poll. longa, costulis tenuibus pluribus patulis extrorsum laxe reticulatis. *Pedunculi* perquam compressi, $\frac{3}{4}$ - in fructu ultrapollicares minusque compressi. *Pedicellus* semipollicaris. *Sepala* lato-ovata acuta dorso adpresse pubera, intus praeter basin strigillosa. *Petala* magnitudine *A. polygyni*, ima basi tumida ochraceo-villosa, caeterum adpresse pubera, exteriora anguste lanceolata fere pollicaria $1\frac{3}{4}$ lin. lata, interiora paullo breviora magis ovalia acuta. *Torus* apice inter carpella pilosulus. *Stamina* numerosa cuneata, connectivi processu ovato-truncato superata. *Ovaria* glabra ovoidea subinaequilatera, apice attenuato brevi *stigma* oblique incrassatum incurvulum ferentia; *immatura* grossificantia non stipitata, sed basi constricta, oblonga. — Bona species videtur, ab *A. polygyno* iam carpellorum numero et forma diversa, foliis etiam maioribus, siccatis pallidis, minus firmis. *Petala* in hac ut in plerisque Anonaceis pro varia evolutione satis ludunt; iuniora elliptica, dein oblonga, demum magis linearia evadunt. — Colitur in h. bog., probabiliter in *Java* indigenus.

ARTABOTRYS SUMATRANUS MIQ. distinctissima species est, ab *A. suaveolente* multo magis distans quam olim credidi, floribus subfasciculato-confertis rigidis maioribus singularem habitum prae se fert. — In *Borneo* habitum paullo diversum induit, *foliis* longioribus, elliptico-oblongis, deorsum magis angustatis, abrupte acuminatis, 7—5 poll. longis; fasciculis valde densifloris; floribus $\frac{3}{4}$ poll. longis. — *Borneo australis*, secus fl. Doesson: KORTHALS.

ARTABOTRYS SUAVEOLENS BL. — Species per totum Archipelagum indicum diffusa, partium magnitudine et habitu variabilis; — *var. parviflora*, floribus minoribus, foliis brevioribus: *Art. parviflorus* MIQ.

Luxuriantia specimina e *Borneo* habeo, *foliis* latioribus et longioribus, floribus semipollicaribus, petalorum laminis angustissimis; *baccis* e singulo flore 2—1 ovalibus obtusis. — *Sumatra*, in sylvis m. Melintang, secus fl. Salaut; *Borneo australis*, in regione fl. Doesson, in Martapoera, in m. Pamatton: KORTHALS.

PARARTABOTRYS MIQ.

Toro haud excavato a *Xylopia* differt, carpellis definitis ab *Habzelia* HOOK. fil. et THOMS. recedit. Ovaria oblonga angulata styloque brevi instructa, et, quod sub accuratiore examine vidi, biserialiter pluriovulata. — Si, quod testantur cel. BENTHAM et HOOKER, *Parartabotrys sumatrana* eadem stirps est ac *Xylopia malayana*, haec nostri generi sine dubio adiungenda foret.

1. PARARTABOTRYS HEXAGYNU斯 MIQ. n. sp. *Innovationes* rubiginoso-tomentosae; *folia* longiuscule petiolata, e basi acuta vel obtusiuscula elliptico- vel saepe obovato-oblonga, passim obovata, breviter obtuse vel acute saepe oblique apiculata pergamentacea, supra praeter costam sulcatam glabrata, subtus pallidiora puberula, costulis utrinque 14—12 tenuibus patulis subaveniis; pedunculi laterales brevissimi aut subnulli, pedicello elongato medio unibracteolato; sepala 3 ovato-rotundata brevissime obtuso-apiculata; petalorum lamina lanceolato-linearis, interiora paullo breviora, omnia crassa plana utrinque subcarinato-uninervia; carpella 5—6 hirsutula prismatica biserialiter usque 10-ovulata.

Rami teretes glabri; *ramuli* patule pubescentes. *Petoli* semipollicares vel paullo longiores pubescentes, in sulco antico pube vulgo ochrascente, uti in costae sulco versus basin. *Folia* in sicco supra nigrescentia laevia, subtus olivaceo-glaucouscentia, costulis teneris sed distinctis ante marginem obsolete arcuato-unitis, venis subnullis,

pube diutius praesertim in costa persistente, nunc subgrisea, 6—4½ poll. longa, fere 3—2 supra medium lata. *Pedunculi* laterales et oppositifolii vix lineam longi apice decidue bracteati, *pedicellum* vulgo unum (rarius 2—3) cum calyce intus et extus pubescentem vel puberulum, ½—¾ poll. longum, medio vel parum demissius unibracteolatum exserentes. *Bracteola* ovata obtusa. *Sepala* lato-ovato-rotundata, ex apice rotundato oboletissime sed constanter apiculata, in sicco nigrescentia, ima basi connata, indumento versus margines densiore leviterque ochrascente. *Petala* biseriatim valvata basi concava genitalia arcte amplectentia, laminis elongatis iam in alabastris erecto-patulis linear-lanceolatis, a basi inde regulariter angustatis utrinque, ochrascenti-tomentellis, crasso-compresso-planis sed nervo medio obtuso-subcarinatis, haud tamen triquetris vel tetragonis, interiorum paullo brevioribus, 1½—1 poll. longis. *Torus* e calycis fundo emens, foveolatus pilosulus, extrorsum staminifer, vertice leviter convexo pistillifer. *Stamina* pluriserialia cuneiformia, deorsum valde angustata, *antherarum* loculis elongatis sublateralibus, dorso scil. connectivo linear separatis, vertice eius processu oblique truncato subrhombico superatis. *Carpella* 6, rarissime 4—5, ovario prismatico linear flavid-velutino-hirtello biserialiter 8. fere 10-ovulata, ovulis fere uniserialiter superpositis ovalibus. *Styli* in fl. nondum perfectis breves, *stigmatibus* arcte conglutinatis. *Carpella* matura adsunt, sed dubia, separata; unum obovali-ellipsoideum subsessile semipollicare, pericarpio monospermo; alterum quod prostat usque 6-spermum, seminibus transversis biserialiter alternis, oblongo-obovoideum, vix certe etiam hoc referendum. — *Maturi pedunculi* autem in herb. DE VRIESE obvii certi, plerumque solitarii, pollares firmi lignosi, toro parum incrassato laevigato plerumque 4 carpella exserente. Haec brevi-stipitata subglobosa cerasi mole vel maiora ellipsoidea oligosperma leviter vel vix torosa, nigrescentia glabra. — *Sumatra occidentalis*, in sylvis m. Melintang et ad pedem montis Singalang: KORTHALS, DE VRIESE.

CATALOGUS ANONACEARUM, IN ARCHIPELAGO INDICO HACTENUS DETECTARUM.

Adnot. Species continentales heic haud receptae; illae vero quae in ins. Poeloe-Pinang crescunt, additae. — I. S. B. C. significant Javam, Sumatram, Borneum et Celebem.

Tribus I. UVARIEAE BENTH. et HOOK. fil.

- I. *Tetrapetalum* MIQ. — 1. *T. volubile* MIQ. (B.).
- II. *Uvaria* LINN. — 2. *U. purpurea* BL. (I. S. B.). — 3. *U. littoralis* BL. (I.). — 4. *U. heterocarpa* BL. (I.). — 5. *U. flava* TEYSM. et BINNEND. (Banca). — 6. *U. dulcis* DUN. (I.). — 7. *U. rufa* BL. (I.). — 8. *U. multiflora* TEYSM. et BINNEND. (I.). — 9. *U. dasychlamys* MIQ. (S. I.). — 10. *U. scabra* MIQ. (Ceram). — 11. *U. cyrtopoda* MIQ. (Amboina). — 12. *U. atrosticta* MIQ. (S.). — 13. *U. Larep* MIQ. (S.). — 14. *U. timoriensis* BL. (Timor). — 15. *U. Zippeliana* MIQ. (Amboina). — 16. *U. ptychocalyx* MIQ. (S. B.) — 17. *U. monticola* MIQ. (B.). — 18. *U. acuminatissima* MIQ. (B.). — 19. *U. argentea* BL. (I. B.). — 20. *U. concava* TEYSM. et BINNEND. (S.). — 21. *U. subcordata* MIQ. (Moluccae). — 22. *U. montana* BL. (I.). — 23. *U. parviflora* HOOK. fil. et THOMS. (Poeloe Pinang, non vidi). — 24. *U. ochroleuca* ZOLL. (I.), non vidi, ex fructu nisi polyspermus dictus fere seq. generis. — 25. *U. sessiliflora* EI. (I., non vidi).

III. *Ellipeia* HOOK. fil. et THOMS. — 1. *E. Laha* MIQ. (S.). — 2. *E. gilva* MIQ. (B.). — 3. *E. cinerascens* MIQ. (S.).

IV. *Sageraea* DALZ. — 1. *S. lanceolata* MIQ. (B.). — An hoc *Uvaria micrantha* HASSK. *Hort. bog. descr. p. 1?* nulli generi apte adscribenda (I.).

V. *Stelechocarpus* (BL.) HOOK. fil. et THOMS. — 1. *St. Burahol* BL. (I.).

VI. *Sphaerothalamus* HOOK. fil. et THOMS. — 1. *Sph. insignis* HOOK. fil. et THOMS. (B., non vidi).

Tribus II. UNONEAE KOR. (excl. Artobotryo).

- VII. *Cananga* RUMPH. — 1. *C. odorata* HOOK. fil. et THOMS. (I. S. B.).
- VIII. *Unona* LINN. — 1. *U. discolor* VAHL (I. S. B.). — 2. *U. dasymaschala* BL. (I. S.). — 3. *U. stenopetala* HOOK. fil. et TH. (I., non vidi). — 4. *U. subbiglandulosa* MIQ. (B.). — 5. *U. borneensis* MIQ. (B.). — 6. *U. costata* MIQ. (S.). — 7. *U. sumatrana* MIQ. (S.). — 8. *U. acuta* ZOLL. (I., non vidi). — 9. *U. Dunali* WALL. (P. Pinang).
- IX. *Meiogyne* MIQ. — *M. virgata* MIQ. (I. S. B.).
- X. *Monocarpia* MIQ. — 1. *M. euneura* MIQ. (B.).
- XI. *Disepalum* HOOK. fil. et THOMS. — 1. *D. anomalum* HOOK. fil. et THOMS. (B., non vidi).
- XII. *Polyalthia* BL. — 1. *P. cinnamomea* HOOK. fil. et THOMS. (P. Pinang). — 2. *P. obliqua* HOOK. fil. (B., non vidi). — 3. *P. microtus* MIQ. (B.). — 4. *P. sakumbangensis* MIQ. (B.). — 5. *P. macrorhyncha* MIQ. (S.). — 6. *P. celebica* MIQ. (C.). — 7. *P. subcordata* BL. (I. S.). — 8. *P. affinis* TEYSM. et BINNEND. (I., non vidi). — 9. *P. elliptica* BL. (I. S.). — 10. *P. miniata* TEYSM. et BINNEND. (I., non vidi).